



Datos

2 Ciclos de Engorda

1er Ciclo: 37 días
2do Ciclo: 35 días

Período

De Agosto a Noviembre
2013

Género

Pollos de engorda
Raza: ROSS

Cantidad animales

1.000 pollos de engorda
por ciclo

Variables de medida

- Ganancia diaria de peso
- Malos olores
- Concentración de amoníaco

Contacto

Conocido internamente

Prueba de Validación



LFZ Gumpenstein: Adición de IPUSagro F, IPUSagro H800 y IPUSagro B120 en Pollos de Engorda

Objetivo de la Prueba:

El estudio examinó los efectos del aditivo alimenticio IPUSagro F y la camada IPUSagro H 800 y B 120 sobre el rendimiento de los animales, así como las emisiones de amoníaco y de olor. Se medieron todas las variables climáticas (temperature, humedad relativa, los gases corrosivos NH3 y CO2) durante los dos ciclos de engorda para asegurar una comparabilidad absoluta entre la granja de prueba y la granja de control.

Modo de aplicación:

Dieta convencional (pellets) suministrado automáticamente en el grupo control. El grupo de prueba recibió la misma cantidad de comida solo que se sustituyeron el 0.5% al 2% (según el período de engorda) por la alimentación con IPUSagro F. En el grupo control se usaron pellets de paja y en el grupo de prueba se usó la cama IPUSagro H800 y B120. La prueba de validación fue supervisada por la Ing. Mösenbacher-Molterer y el Ing. Zentner.

RESULTADOS

- Reducción significativa de la concentración de amoníaco: hasta un 14%
- Mayor aumento de peso (engorda): hasta un 8%
- Reducción significativa del gas CO2: hasta un 17.14%
- Reducción de los malos olores: hasta un 26.4%
- Mejora en la tasa de conversión alimenticia


El LFZ Gumpenstein confirmó que los MIGUALDORES de IPUS están claramente apropiados para reducir las concentraciones de amoníaco y los malos olores además de brindar mejoras significativas para todos los indicadores de desempeño.

Distribuidor Exclusivo:

Mayerwaren International SA de CV

www.mayerwaren.com

www.eco-tabs.mx





Prueba de Validación

Graficas y Estadísticas

Datos

2 Ciclos de Engorda

1er Ciclo: 37 días
2do Ciclo: 35 días

Período

De Agosto a Noviembre
2013

Género

Pollos de engorda
Raza: ROSS

Cantidad animales

1.000 pollos de engorda
por ciclo

Variables de medida


- Ganancia diaria de peso
- Malos olores
- Concentración de amoníaco

Contacto


Conocido internamente



Concentración en amoniaco



Olores



Distribuidor Exclusivo:

Mayerwaren International SA de CV

www.mayerwaren.com

www.eco-tabs.mx





Prueba de Validación



Graficas y Estadísticas

Datos

2 Ciclos de Engorda

1er Ciclo: 37 días
2do Ciclo: 35 días

Período

De Agosto a Noviembre
2013

Género

Pollos de engorda
Raza: ROSS

Cantidad animales

1.000 pollos de engorda
por ciclo

Variables de medida

- Ganancia diaria de peso
- Malos olores
- Concentración de amoníaco


Contacto

Conocido internamente

Peso por animal en gramos
(Ciclo de 37 días)



Peso por animal en gramos
(Ciclo de 35 días)



Distribuidor Exclusivo:

Mayerwaren International SA de CV

www.mayerwaren.com

www.eco-tabs.mx

